SUR UNE VARIÉTÉ DE «PHYLLORHINA COMMERSONI» DE L'ILE ST. THOMÉ

PAR

J. V. BARBOZA DU BOCAGE

Phyllorhina Commersoni, var. thomensis.

Deux individus, ♂ et ♀ adultes.

Ces individus ressemblent à *Ph. Commersoni* par leur conformation générale, par la forme de leur fer-à-cheval et par leurs caractères de dentition; mais ils diffèrent de nos individus d'Angola et d'autres localités d'Afrique occidentale: 1° par leur taille, sensiblement plus petite; 2° par le nombre des plis cutanés latéraux du fer-à-cheval, trois au lieu de quatre; 3° par leurs couleurs, d'un brun-noirâtre foncé et uniforme en dessus, plus pâles en dessous, avec une tache blanchâtre sur le tiers supérieur de la face interne du bras. Les membranes des ailes et la peau nue des membres sont noires.

Chez la femelle de cette variété, comme chez la femelle du *Ph. Commersoni,* l'orifice du sac frontal est bien distinct, et ses appendices pubiens sont assez developpés ainsi que les mamelles, les uns et les autres noirs.

Dimensions:

Longueur total (tête et tronc).....	♂ 106 mm.	♀ 102 mm.
» de la tête.....	34 »	32 »
» de l'oreille.....	25 »	35 »
» de l'avant-bras.....	82 »	81 »
» du 3e doigt	126 »	124 »
» du pollex.....	18 »	17 »
» de la queue.....	29 »	30 »

Habitat: la femelle a été recueillie à *Roça Saudade,* le mâle à *Ribeira peixe.*

L'espèce est connue à St. Thomé sous le nom de *Guimbu.*

Comme je l'ai déjà remarqué ailleurs, M. Greeff cite à peine deux chauves-souris de St. Thomé, *Cynonycteris straminea* et *Phyllorhina caffra,* l'une et l'autre non encore rencontrées dans cette île par M. Newton (V. *Jorn. Ac. Sc. de Lisboa,* 2.ª série, I, p. 197).